6. Bijvoeren



In PARTRIDGE worden patrijzen in alle voorbeeldgebieden tijdens de wintermaanden bijgevoerd met graan. Het doel is om de overlevingskans van patrijzen in de winter te verhogen en hun conditie in het voorjaar te verbeteren.

WAAROM

Moderne machines en methodes laten weinig gewasresten en zaden achter op de akkers. De PARTRIDGE bloemenblokken bieden in de herfst en vroege wintermaanden veel wintervoedsel, maar in de late winter worden ook hier de zaden schaars. Vanaf januari breekt voor veel zaadetende akkervogels een periode van voedselgebrek aan (hungry gap).

Door bijvoeren help je patrijzen door deze moeilijke periode heen. Bijvoeren tijdens de winter verbetert hun lichaamsconditie en draagt zo bij aan een hoger broedsucces. Op de lange termijn streven we naar een landschap waarin ook 's winters genoeg voedsel te vinden is en bijvoeren overbodig wordt.

Bijvoeren tijdens de winter verbetert de lichaamsconditie van patrijzen en draagt zo bij aan een hoger broedsucces.



Voederton Jochem Sloothaak

Voederton Chris Knights

AANLEG

1. Bijvoeren doen we van oktober tot april met tarwe of andere graansoorten.
2. Gebruik voedertonnen van 30 à 40 liter met een schroefdeksel om de granen droog en schimmelvrij te houden. Er zijn speciale voederspiralen (nozzles) in de handel om 'knoeien' en dus ophoping van granen onder voedertonnen zoveel mogelijk te beperken.
3. De tonnen worden omringd met een hekwerk van betonijzer en zo nodig schapengaas met 15 x 15 cm openingen tegen ongewenste bezoekers.
4. Plaats tenminste één voederton per patrijzenkoppel, bij voorkeur in het open veld. Tonnen in de buurt van bosjes en hagen trekken meer rovers, ratten en muizen aan.
5. Begin het bijvoeren in het open veld, en verplaats de tonnen dan gaandeweg de winter steeds meer in de richting van geschikte nestgelegenheid. Bijvoorbeeld op of naast een keverbank, in een bloemenblok, langs ruig grasland of ongemaaide taluds.

BEHEER

Een voederton moet elke 14 dagen over een korte afstand van ongeveer 20 meter worden verplaatst. Dit is nodig om de overdracht van mogelijk ziekteverwekkers tussen vogels te voorkomen. Als er rattenholen onder de voederton zichtbaar zijn, is het noodzakelijk om de ton te verplaatsen. Bij strenge winterse omstandigheden is het beter om verplaatsing enkele dagen uit te stellen.

Zorg dat tonnen regelmatig bijgevuld worden, want vogels wennen snel aan een betrouwbare voedselbron.

Naast patrijzen zijn fazanten, holenduiven en in waterrijke gebieden ook bruine ratten veel voorkomende bezoekers van voedertonnen. Met behulp van wildcamera's kan het gebruik van de voedertonnen worden gevolgd.

Voor en na het winterseizoen moeten de materialen van de voedertonnen goed worden gereinigd.

MEER WETEN?

Kijk voor gratis downloads en meer informatie over PARTRIDGE op **www.vogelbescherming.nl/PARTRIDGE**.

Vogelbescherming NEDERLAND

Interreg North Sea Region PARTRIDGE European Regional Development Fund EUROPEAN UNION